Une jolie formule...

Une abominable démonstration !

Considérons C_f la courbe représentative d'une fonction f de classe C^2 sur un intervalle ouvert U . En un point A de U , d'abscisse a , il est possible de calculer le « rayon de courbure » noté

R selon :
$$R = \frac{(1 + (f'(a))^2)^{\frac{3}{2}}}{f''(a)}$$
 (formule que j'ai trouvée dans un vieux livre de maths).

Pour dire les choses autrement, R est le rayon d'un cercle qui épouserait au mieux C_f au voisinage de A .

Le but de cet exercice est de retrouver cette formule et de la corriger en cas de légère erreur (dans les vieux livres... on ne sait jamais).

On considère le schéma suivant :

On note T_a la tangente à C_f en A (d'abscisse a). Droite orange en trait plein.

On note T_{a+h} la tangente à C_f en A' (d'abscisse $a+h$). Droite orange en pointillés.

Remarque : en mathématiques, h peut être un réel négatif !

On note ensuite : N_a la normale associée à T_a passant en A (droite verte, trait plein).

N_{a+h} la normale associée à T_{a+h} passant en A' (en vert et en pointillés).

On suppose que lorsque h tend vers 0, la normale N_{a+h} va croiser la normale N_a en un point noté Ω_h qui tendra vers un certain point Ω (le centre du cercle rouge définissant le fameux rayon de courbure ! Ainsi, en notant $R_h = A\Omega_h$, on pourrait affirmer :
$$R = \lim_{h \rightarrow 0} A\Omega_h$$

Cet espoir étant posé, il reste à voir ce qu'il devient dans nos calculs...

1) Déterminez les équations des normales N_a et N_{a+h} . Rappel : deux droites de pentes non nulles p et p' sont orthogonales dans un repère orthonormé lorsque $pp' = -1$.

Conseils : on peut noter pour certains calculs : $c = f'(a)$ et ensuite vous pourrez aussi poser $d = f''(a)$.

2) Déterminez x_h l'abscisse de Ω_h . Montrez que x_h admet une limite lorsque h tend vers 0. Conseil : posez astucieusement vos expressions sachant que vous devrez faire tendre h vers 0.

3) Calculez alors le carré de R_h et montrez qu'il admet bien une limite intéressante pour notre propos...